



Формы дизартрии

- Бульбарная дизартрия.
- Подкорковая дизартрия.
- Мозжечковая дизартрия.
- Корковая дизартрия.
- Псевдобульбарная дизартрия.

Рекомендации родителям при выявлении признаков дизартрии

При первых же подозрениях на дизартрию у ребенка для обследования, уточнения диагноза и назначения адекватного лечения, необходимо посетить следующих специалистов:

- детского невролога,
- логопеда.

При несвоевременном выявлении, отсутствии или недостаточности проведения лечебно-реабилитационных мероприятий данное речевое расстройство приводит к ограничениям таких категорий жизнедеятельности ребенка, как общение и обучение.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ДИЗАРТРИИ У ДЕТЕЙ



Дизартрия - расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата.



Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и речи, при тяжелых поражениях возникает анартрия.



Причины возникновения дизартрии:

- органические поражения ЦНС в результате воздействия различных неблагоприятных факторов на развивающийся мозг ребенка во внутриутробном и раннем периодах развития;
- влияние острых и хронических инфекций;
- кислородная недостаточность (гипоксия, асфиксия);
- интоксикации;
- токсикоз беременности;
- несовместимость по резус-фактору.
- инфекционные заболевания нервной системы в первые годы жизни ребенка.



Основные симптомы дизартрии

- К признакам дизартрии относятся:
- слабость артикуляционных мышц, которая проявляется по-разному: при открытом рте язык ребёнка вываливается самопроизвольно наружу, губы слишком плотно сжаты или чересчур вялые и не смыкаются, наблюдается повышенное слюноотделение;
 - сложности с жеванием и глотанием - ребенок «поперхивается» пищей;
 - ребёнок постоянно говорит в нос, хотя признаков гайморита и насморка нет;
 - звуки в словах искажаются, заменяются на другие, пропускаются, причём не какой-то один определённый звук, а несколько или сразу все;
 - нарушается речевое дыхание: к концу фразы речь затухает, в середине предложения ребёнок может задохнуться, начать часто дышать;
 - наблюдаются нарушения голоса: у детей, страдающих дизартрией, он слишком высокий и писклявый или глухой и затухающий;
 - проблемы с мелодичностью речи: ребёнок не в состоянии изменять высоту тона, речь отличается монотонностью, поток слов слишком быстрый или чересчур замедленный, но в обоих случаях непонятный.